

Procent (%) trwałego uszczerbku na zdrowiu**OBOJCZYK**

Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego - I° - II° - III°	1,5% 3,0% 4,5%
---	----------------------

BARK

Zwichnięcie stawu barkowego z wyjątkiem zwichnięć nawykowych	6,5 %
--	-------

STAW ŁOKCIOWY

Zwichnięcie stawu łokciowego	5,0%
------------------------------	------

NADGARSTEK

Zwichnięcie kości nadgarstka	5,5%
------------------------------	------

PALCE RĘKI I –V

Zwichnięcie stawów międzypaliczkowych lub śródrečno paliczkowych	1,5%
--	------

Kończyna dolna

BIODRO

Zwichnięcie stawu biodrowego	20%
------------------------------	-----

KOLANO

Zwichnięcie stawu kolanowego	10% - 20%
Uszkodzenie jednego więzadła pobocznego lub krzyżowego	5%
Uszkodzenie dwóch więzadeł – pobocznych lub krzyżowych	8%
Uszkodzenie trzech lub więcej więzadeł - krzyżowych lub pobocznych	15%

STOPA – STAW SKOKOWY-GOLENIOWY I SKOKOWO-PIĘTOWY

Całkowite zwichnięcie stawu skokowego	12%
Całkowite zwichnięcie stawów stopy, z wyłączeniem stawów śródstopno palcowych i stawów palców	6%